

DLP 25-08-9 000069207

ISSN 0980-9384

Avertissements agricoles

PUBLICATION PÉRIODIQUE
ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de Recettes de la D.R.A.F.
C.C.P. Montpellier 5238-12 G

57M - 29 juillet 1992

GRANDES CULTURES SEMENCES - N° 9

LUZERNE

PROTECTION DES GOUSSES VERTES

PUNAISES MIRIDES : présentes dans toutes les parcelles souvent au dessus du seuil d'intervention dans le GARD et l'HERAULT


TORDEUSES : fin du vol en zone précoce, présence discrète ailleurs

La majorité des parcelles est au stade gousses vertes (quelques gousses brunes commencent à être observées)

PUNAISES

Sur la plupart des parcelles observées le seuil d'intervention est atteint ou va l'être prochainement à l'exception des parcelles de l'AUDE.

Intervenir dans toutes les parcelles
avec un produit à base d'endosulfan à
1 000 g de m.a./ha (nombreuses spécialités)



Stade I Stade III Stade V Adulte

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
ÉDITION DE LA STATION LANGUEDOC-ROUSSILLON
Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5, place Chaptal
34076 MONTPELLIER CEDEX - Tél. 67 92 41 42



TORDEUSES

Le vol se termine dans les zones précoces côtières (Biterrois et basse vallée de l'Hérault). Il est trop tard pour intervenir si cela n'a déjà été fait.

Dans les autres secteurs les captures sont faibles à nulles.

TYCHIUS - PUCERONS

Présence faible dans de nombreuses parcelles en dessous des seuils d'intervention et en présence de prédateurs pour les pucerons. Ne pas intervenir dans l'immédiat.

MAIS

SESAMIE-PYRALE : Les vols de 2ème génération n'ont toujours pas commencé. Attendre un prochain avis

ACARIENS : A surveiller. Intervenir si nécessaire

Stade phénologique : début apparition panicule à fin floraison du mâle.

SESAMIE

Pas de captures aux pièges "femelles vierges" ou phéromones pour le deuxième vol.

Les dégâts de première génération ont été apparemment assez faibles.

Attendre un prochain avis pour intervenir.

PYRALE

Les larves de première génération relativement abondantes dans quelques parcelles viennent de se nymphoser. Attendre là aussi un prochain avis.

ACARIENS

A la suite des chaleurs des quinze derniers jours quelques foyers ont été observés dans le sud du GARD. Surveillez attentivement les bordures de parcelle en tous secteurs et intervenez si nécessaire

avec : CESAR 0,25 kg/ha)
APPOLLO 0,41/ha) en tout début d'infestation

ou avec : KELTHANE EC 41/ha)
OMITE 57 EL 21/ha)
+ TALSTAR 0,3 l/ha et TALSTAR FLO 0,375l/ha) sur attaques déclarées